

ข้อสอบ CME การฆ่าตัวตาย

- 1.) วัยที่พบการเสียชีวิตจากฆ่าตัวตายสูงสุด
 - ก. วัยเด็ก
 - ข. วัยหนุ่มสาว
 - ค. วัยสูงอายุ
 - ง. พบทุกวัยพอๆ กัน

- 2.) ปัจจัยใดเสี่ยงใดสำคัญที่สุดในการประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 - ก. ดิตรูรา
 - ข. โรคซึมเศร้า
 - ค. มีแผนฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
 - ง. มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน

- 3) ผู้ที่ตั้งใจฆ่าตัวตายจริงมักจะไม่บอกคนอื่น
 - ก. ถูก
 - ข. ผิด

- 4) ผู้ที่บังคับเครื่องบินชนตึก world trade center จัดเป็นการฆ่าตัวตายประเภทไหน
 - ก. Egoist
 - ข. Altruistic
 - ค. Anomic

- 5) ข้อใดไม่ใช่ suicidal behavior
 - ก. Suicidal ideation
 - ข. Parasuicide
 - ค. Imitate suicide
 - ง. Completed suicide

6. ผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมีการตัดสินใจที่แน่นอนแล้ว
 - ก. ถูก
 - ข. ผิด

7. การถามผู้ป่วยถึงเรื่องการฆ่าตัวตายต้องถามอย่างระมัดระวังเพราะอาจไปกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดฆ่าตัวตายขึ้นมาได้

ก. ถูก

ข. ผิด

8. ขณะรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอยู่ในโรงพยาบาลควรให้ญาติมีส่วนร่วมในการช่วยผู้ป่วย

ก. ถูก

ข. ผิด

9. ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ต้องมีป้ายเตือนไว้ที่เตียงเพื่อให้ผู้อื่นคอยช่วยกันระมัดระวัง

ก. ถูก

ข. ผิด

10. การสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงควรให้ญาติอยู่ด้วยทุกครั้งเพื่อจะได้ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ก. ถูก

ข. ผิด